



	Инфекция Возраст	ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	ТУБЕРКУЛЕЗ	ПНЕВМОКОК- КОВАЯ ИНФЕКЦИЯ	ДИФТЕРИЯ КОКЛЮШ СТОЛБНЯК	ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ	ПОЛИО- МИЕЛИТ	КОРЬ КРАСНУХА ПАРОТИТ	ГРИПП
В роддоме	НОВОРОЖДЕННЫЕ первые 24 часа	1							
	НОВОРОЖДЕННЫЕ первые 3 – 7 дней		1						
В прививочном кабинете	1 МЕСЯЦ	2							
	2 МЕСЯЦА	3*		1					
	3 МЕСЯЦА				1	1*	1		
	4,5 МЕСЯЦА			2	2	2*	2		
	6 МЕСЯЦЕВ	3			3	3*	3		1
	7 МЕСЯЦЕВ								
	8 МЕСЯЦЕВ								
	12 МЕСЯЦЕВ	4*						1	
	15 МЕСЯЦЕВ			3					
	18 МЕСЯЦЕВ				4	4*	4		
	20 МЕСЯЦЕВ						5		Ежегодно
	26 МЕСЯЦЕВ								
	6 ЛЕТ		2					2	



Многие прививки имеют продолжение схем вакцинации после 6 лет – уточняйте у участкового педиатра.

ВАЖНО: в зависимости от инфекции для выработки стойкого иммунитета может потребоваться несколько прививок. Только вакцинация, проведенная по полной схеме, сможет обеспечить выработку качественной защиты против инфекции!

^{*} для детей группы риска

^{1.} Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. N 125н