



**ПРЕДОТВРАТИТЕ  
РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ  
У ВАШЕГО МАЛЫША –  
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!**

Имеются  
противопоказания.  
Необходимо  
проконсультироваться  
со специалистом

**ОГБУЗ «Центр  
медицинской профилактики  
Костромской области»**

(4942) 45-01-35  
г. Кострома, ул.Ленина, 151  
[cmp@lpu.dzo-kostroma.ru](mailto:cmp@lpu.dzo-kostroma.ru)  
[ok.ru/zdorovaya.kostroma/](http://ok.ru/zdorovaya.kostroma/)  
[vk.com/zdorovaya\\_kostroma](http://vk.com/zdorovaya_kostroma)  
[www.cmp44.ru](http://www.cmp44.ru)



# ГЕПАТИТ В



## СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ СТАНДАРТНАЯ:

**1 день жизни младенца**  
**1 месяц**  
**6 месяцев**

Первая, вторая и третья вакцинации проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации), за исключением детей, относящихся к группам риска.

Схема вакцинации 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации) подходит и для детей от 1 года до 18 лет, взрослых от 18 до 55 лет, не привитых ранее.

## СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ РИСКА\*:

**1 день жизни младенца**  
**1 месяц**  
**2 месяца**  
**12 месяцев**

Вакцинация проводится по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 4 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).

\*К группам риска относятся дети, родившиеся от матерей носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами.



## ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ В\*\*

Печеночно-клеточный рак, цирроз печени, острая печеночная энцефалопатия (печеночная кома).  
Хронические инфекции развиваются у 80-90% детей, инфицированных в течение первого года жизни.

Хронические инфекции развиваются у 30-50% детей, инфицированных в возрасте до шести лет.

**ЗАЩИТА, КОТОРУЮ ДАЕТ ПРИВИВКА  
(от заражения и получения осложнений)**

**86%\*\*\***

*\*\*/\*\*/\*\* Информация с ресурса [www.yaprivit.ru](http://www.yaprivit.ru)*

