



**ПРЕДОТВРАТИТЕ  
РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ  
У ВАШЕГО МАЛЫША –  
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!**

Имеются  
противопоказания.  
Необходимо  
проконсультироваться  
со специалистом

**ОГБУЗ «Центр  
медицинской профилактики  
Костромской области»**

(4942) 45-01-35  
г. Кострома, ул. Ленина, 151  
[cmp@lpu.dzo-kostroma.ru](mailto:cmp@lpu.dzo-kostroma.ru)  
[ok.ru/zdorovaya.kostroma/](http://ok.ru/zdorovaya.kostroma/)  
[vk.com/zdorovaya\\_kostroma](http://vk.com/zdorovaya_kostroma)  
[www.cmp44.ru](http://www.cmp44.ru)

**КОРЬ, КРАСНУХА,  
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ  
ПАРОТИТ**





## **ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ЕДИНО-РАЗОВО В ВОЗРАСТЕ 12 МЕСЯЦЕВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕВАКЦИНАЦИЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6 ЛЕТ.**

Вакцинация против кори, ревакцинация против кори может проводиться:


- **детям от 1 года до 18 лет** (включительно) и взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведения о прививках против кори;
- **взрослым от 36 до 55 лет** (включительно), относящимся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

**Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев.**

## **ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ\* ОТ ЗАРАЖЕНИЯ:**

- **корью** – пневмония; у детей младшего возраста – ложный круп, стоматиты; чаще у взрослых – менингиты, менингоэнцефалиты и полиневриты; редко – коревой энцефалит. Вероятность получить осложнения – 30% (слепота, энцефалит, диарея, тяжёлые инфекции дыхательных путей). Из них 1/1000 – энцефалит;

- **краснухой** - пневмония, отит, артрит, ангина, реже – тромбоцитопеническая пурпура; крайне редко (в основном у взрослых) – энцефалиты, менингоэнцефалиты и энцефаломиелиты. Наиболее опасное осложнение – краснушный (наподобие коревого) энцефалит (воспаление мозга), его частота составляет 1:5000-1:6000 случаев. При краснухе у беременных возможно формирование разнообразных пороков развития плода (катаракта, глухота, порок сердца, микроцефалия, гепатит, пневмония, менингоэнцефалит, анемия и др.). У беременных женщин приводит к спонтанным абортam (10-40%), мертворождению (20%), гибели новорожденного (10-20%);



- **эпидемическим паротитом** - серозный менингит, менингоэнцефалит (в редких случаях), орхит и эпидидимит, оофорит, острый панкреатит. У 20-30% заболевших мальчиков-подростков и взрослых мужчин воспаляются яички (орхит), у девушек и женщин в 5% случаев вирус эпидемического паротита поражает яичники (оофорит). Оба этих осложнения могут стать причиной бесплодия. Панкреатит (воспаление поджелудочной железы) регистрируется в качестве осложнения паротитом. Вирус эпидемического паротита может вызвать воспаление оболочек головного мозга (менингит) у 1 из 200-5000 заболевших, очень редко в процесс вовлекается ткань головного мозга, тогда развивается паротитный энцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга). Приобретенная нейросенсорная глухота, вызванная паротитом, является одной из основных причин глухоты в детстве, которая проявляется у 5 на 100 000 больных паротитом.

### **ЗАЩИТА, КОТОРУЮ ДАЕТ ПРИВИВКА (от заражения и получения осложнений)\*\*:**

- **корь – 99%**
- **краснуха – 99%**
- **эпидемический паротит – 99%**

\*/\*\* - Информация с ресурса [www.yaprivit.ru](http://www.yaprivit.ru)