


**ПРЕДОТВРАТИТЕ
РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ
У ВАШЕГО МАЛЫША –
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!**


Имеются
противопоказания.
Необходимо
проконсультироваться
со специалистом



ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

**ОГБУЗ «Центр
медицинской профилактики
Костромской области»**

(4942) 45-01-35
г. Кострома, ул.Ленина, 151
cmp@lpu.dzo-kostroma.ru
ok.ru/zdorovaya.kostroma/
vk.com/zdorovaya_kostroma
www.cmp44.ru








СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ:



2 месяца
4,5 месяца

Детям в возрасте 15 месяцев проводится ревакцинация

Вакцинация детей, которым иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции не была начата в первые 6 месяцев жизни, проводится двукратно с интервалом между прививками не менее 2 месяцев.



ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ:*

ОРЗ, отиты, синуситы, бронхиты, внебольничные пневмонии, менингит, инвазивная пневмония, пневмококковая бактериемия, артрит, эндокардит.

Особой тяжестью отличается пневмококковый менингит, частота которого составляет около 8 на 100 тыс. детей до 5 лет. В среднем около 83% случаев пневмококкового менингита наблюдаются среди детей в возрасте младше 2-х лет.

Одним из осложнений также является задержка нервно-психического развития у детей. От 8,7% до 52% случаев пневмонии наблюдается среди младенцев в возрасте младше 6 месяцев.

Пневмококковые отиты отличаются большей тяжестью, склонностью к перфорации барабанной перепонки. Пневмококковый отит является самой частой причиной снижения слуха у детей.

Одной из самых неприятных и редко диагностируемых форм болезни специалисты считают пневмококковую бактериемию, которую у нас в стране ежегодно переносят более 3 тысяч детей.

ЗАЩИТА, КОТОРУЮ ДАЕТ ПРИВИВКА (от заражения и получения осложнений)

- 73-90%**

*/** - Информация с ресурса www.yaprivit.ru

